

5. Differentialrechnung


5.1. Wozu Informatikerinnen Differentialrechnung brauchen

- In vielen technischen Problemen interessiert man sich für die momentane Steigung (= Änderungsgeschwindigkeit) von Funktionen (Bsp. Weg > Geschwindigkeit > Beschleunigung). Der Differentialquotient liefert die genaue Berechnung.
- In der **Computergraphik** möchte man oft durch vorgegebene Punkte eine möglichst "glatte" Kurve zeichnen. Die Differentialrechnung gibt uns die mathematischen Mittel, um genau zu beschreiben, was "glatt" heißt.
- Bei der **Optimierung** reeller Funktionen sucht man Stellen mit Steigung 0 (lokale Extrema, $f'(x)=0$) >> **Extremwertaufgaben**.
- Um $\sin(x)$, e^x , $\ln(x)$ numerisch auf dem Rechner zu bestimmen, braucht man den **Satz von Taylor**. Um funktionale Zusammenhänge zu vereinfachen ebenfalls.
- Die Differentialrechnung ist die Grundlage für **Differentialgleichungen (DGLs)** >> DGLs (s. Mathe 2) braucht man, wenn man dynamische Systeme auf dem Rechner simulieren will (z.B. Ökosysteme, Wirtschaftssysteme oder Flugzeugsimulatoren)
- Mittels Ableitungen können wir entscheiden, ob **Fixpunktiteration** konvergiert. Wir können also den Erfolg numerischer Berechnungen sicherstellen

5.2. Differenzierbarkeit, Ableitung, Differential

Die Differentialrechnung wurde Ende des 17. Jahrhunderts fast gleichzeitig von Newton und Leibniz entwickelt. Sie bildet zusammen mit der Integralrechnung die Grundlage der rapiden technischen Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert.

Motivation: Wir möchten eine Menge von Punkten durch eine möglichst "schöne" Kurve verbinden.



Aktivierung: Wie erklären wir dem Computer, was "schön" bedeutet?

In Vorlesung wird Begriff der Steigung einer Funktion an der Stelle x_0 entwickelt




Abbildung 5-1: Tangente an den Punkt P einer „glatte“ Funktion

Maple-Animation in [function-plots.mws](#) zeigen!

Def D 5-1: Differenzierbarkeit einer Funktion und Ableitung

Sei $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, mit $y = f(x)$, $x_0 \in D$ und f in einer Umgebung von x_0 definiert. f heißt differenzierbar in x_0 , wenn der Grenzwert

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert. Dieser Grenzwert heißt **Ableitung** der Funktion f an der Stelle x_0 oder **Differentialquotient** von f an der Stelle x_0 .

Schreibweise: $y'(x_0) = f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

Sei $D_{f'} = \{x; x \in D \text{ und } f'(x) \text{ existiert}\}$, dann heißt die Funktion

$f' : D_{f'} \rightarrow \mathbf{R}$, mit $y = f'(x)$ die Ableitungsfunktion von f oder kurz Ableitung von f .

Bemerkungen:

a) Das Berechnen der Ableitung nennt man Differenzieren.

b) Die Betrachtung des Grenzwertes mit $h \rightarrow 0$ ist vollkommen identisch mit der Betrachtung des Grenzwertprozesses $x_0 + h = x \rightarrow x_0$. Der Quotient

$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{(x_0 + h) - x_0}$ bzw. $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ wird **Differenzenquotient** genannt. Von ihm rührt eine weitere Schreibweise der Ableitung her:

$$f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0)$$

Die Größe $df = f'(x_0) \cdot dx$ heißt **Differential** von f an der Stelle x_0 zur Verschiebung dx .

Ü

Beispiel 1): Bestimmen Sie die Ableitung von $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, mit $f(x) = x^2$ in x_0 , indem Sie den Limes aus der Definition ausrechnen!

Können Sie das auch für das allgemeine Polynom $f(x) = x^n$ ($n \in \mathbf{N}$) ?

Lösung in Vorlesung oder [Stingl, 7. Aufl., S. 272]

Beispiel 2): $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, mit $f(x) = |x|$ ist in $x_0=0$ nicht differenzierbar! Zum Beweis genügt es f eingeschränkt auf $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ zu betrachten. Auf $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ ist f nämlich differenzierbar und es gilt

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{für } x > 0 \\ -1, & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

An der Ableitung erkennt man unmittelbar, daß der linksseitige und rechtsseitige Grenzwert des Differenzenquotienten bei $x=0$ verschieden sind, nämlich

$$z^+ = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1 \quad \text{bzw.} \quad z^- = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -1.$$

Nach **Satz S 4-3** existiert aber dann der Grenzwert an der Stelle 0 nicht, und dies bedeutet nach **Def D 5-1**, dass die Funktion bei $x_0=0$ nicht differenzierbar ist.

Anschaulich: f hat an der Stelle $x_0=0$ einen "Knick".

Nicht jede in X_0 stetige Funktion ist also dort auch differenzierbar. Umgekehrt gilt aber:

Satz S 5-1 Aus der Differenzierbarkeit folgt die Stetigkeit.

Beweis [Stingl, 7. Aufl., S. 273]:

Wenn f an der Stelle $x_0 \in D_f$ differenzierbar ist, dann heißt das, dass

$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existiert. Daraus können wir die Stetigkeit herleiten:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \\ &= \underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{f'(x_0)} \underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)}_0 = 0 \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

Def D 5-2 n-te Ableitung und stetige Differenzierbarkeit

Sei $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, mit $x \mapsto f(x)$, $x_0 \in D$ differenzierbar in x_0 , und es sei die Ableitung f' ebenfalls differenzierbar, dann ist zweite Ableitung von f , nämlich f'' , definiert durch die Ableitung der Funktion f' .

Schreibweise:
$$f''(x) = (f'(x))' = \frac{d^2 f(x)}{dx^2}$$

Entsprechen werden die 3., 4. Ableitung usw. definiert. Wir formulieren allgemein die **n-te Ableitung** von f mit $n \in \mathbf{N}$

$$f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)}(x) \right)' = \frac{d^n f(x)}{dx^n}$$

f heißt **n-mal stetig differenzierbar**, falls f n-mal differenzierbar und $f^{(n)}$ stetig ist.

5.3. Ableitungsregeln

Satz S 5-2 Summenregel

Sind die Funktionen u, v differenzierbar, so auch $(u+v)$ mit $(u + v)' = u' + v'$

Satz S 5-3 FaktorregelIst U differenzierbar, so auch $C \cdot U$ mit $C \in \mathbf{R}$ mit

$$(C \cdot U)' = C \cdot U'$$

Satz S 5-4 ProduktregelSind die Funktionen U, V differenzierbar, so auch $(U \cdot V)$ mit

$$(U \cdot V)' = U' \cdot V + U \cdot V'$$

Satz S 5-5 QuotientenregelSind U, V differenzierbar und ist $v(x) \neq 0$, so auch (u/v) mit

$$\left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Beispiel: $f: \mathbf{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} = \frac{x^2}{x+1}$

$$u'(x) = 2x, v'(x) = 1.$$

Damit folgt nach der Quotientenregel

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} = \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

Satz S 5-6 Kettenregel

Seien $f: D_f \rightarrow W_f$, $g: D_g \rightarrow W_g$. Sei f differenzierbar in $x \in D_f$ und $u = f(x) \in D_g$. Weiterhin sei g differenzierbar an der Stelle u . Dann ist $g \circ f$ differenzierbar an der Stelle $x \in D_f$, und es gilt

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x) &= g'(u)|_{u=f(x)} \cdot f'(x) \\ &= g'(f(x)) \cdot f'(x) \end{aligned}$$

Man nennt g' die äußere Ableitung, f' die innere Ableitung von $g \circ f$.

MERKREGEL: "äußere Ableitung mal innere Ableitung". Man spricht auch von "**Nachdifferenzieren**": Nachdem man g an der Stelle $u=f(x)$ abgeleitet hat, muss man f noch an der Stelle x "nachdifferenzieren".

Zur Verkettung von Funktionen vergleiche man **Satz S 4-1**.

$g'(f(x))$ ist eine mathematisch etwas laxe Schreibweise für $g'(u)|_{u=f(x)}$. Man muss im Kopf behalten, dass bei $g'()$ die Ableitung nach u , nicht nach x , gemeint ist.

Beispiel: $h : \mathbf{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbf{R}$, $h(x) = \left(\frac{x^2}{x+1} \right)^2$

Definiere f wie im letzten Beispiel $f(x) = \frac{x^2}{x+1} = u$ und $g(u) = u^2$. Dann ist $h = g \circ f$.

Damit folgt nach der Kettenregel und $g'(u) = 2u$:

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \underbrace{2 \left(\frac{x^2}{x+1} \right)}_{g'(f)} \cdot \underbrace{\frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}}_{f'}$$

Übersicht zu Ableitungen bekannter Funktionen

Funktion	Ableitung	Inverse Funktion	Ableitung
x^a , i.a. $x > 0$	ax^{a-1}	$\sqrt[a]{x}$, $a \in \mathbb{N}$, i.a. $x > 0$	$\frac{1}{a\sqrt[a]{x^{a-1}}}$
$\sin x$	$\cos x$	$\arcsin x$, $ x < 1$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\arccos x$, $ x < 1$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\operatorname{arsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\operatorname{arcosh} x$, $x \geq 1$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\tan x$, $x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\cot x$, $x \neq n\pi$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$	$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
e^x	e^x	$\ln x$, $x > 0$	$\frac{1}{x}$
a^x , $a > 0$, $a \neq 1$	$a^x \ln a$	$\log_a x$, $x > 0$	$\frac{1}{x \ln a}$

WICHTIG: Die e-Funktion ist die einzige Funktion, die gleich ihrer eigenen Ableitung ist.

Einige Formeln werden als Beispiel in Vorlesung vorgerechnet.

Übung: Ableiten!

(a) $f(x) = \frac{x^3}{(x+1)^2}$

(b) $g(x) = \exp(\sin(x^2))$

Satz S 5-7 Ableitung der Umkehrfunktion

Sei $f: D_f \rightarrow W_f$ differenzierbar in $x \in D_f$ und sei $f'(x) \neq 0$. Dann gilt für alle x im Definitionsbereich der Umkehrfunktion f^{-1} :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Der Beweis ist eine einfache Folgerung aus der Kettenregel (s. Vorlesung)

Beispiel: Leiten Sie $(\ln(x))' = 1/x$ ($x > 0$) aus der Formel $(e^x)' = e^x = \exp(x)$ her.

Lösung: $f(x) = e^x$ hat Ableitung $\neq 0$ für alle $x \in \mathbf{R}$ und $f^{-1}(x) = \ln(x)$ ist definiert für alle $x > 0$. Es gilt also nach **Satz S 5-7** für alle $x > 0$:

$$(\ln(x))' = \frac{1}{\exp(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\exp(\ln(x))} = \frac{1}{x} \quad \text{q.e.d.}$$



Übung: Leiten Sie ebenso die Formel für $\arcsin(x)$ und $\arctan(x)$ her.

[Hinweis: trigonometrischen Phytagoras zur Vereinfachung verwenden!]

Ableitung der Betragsfunktion:

Hier zur Sicherheit immer Fallunterscheidung machen! Beispiel:

$$f(x) = |(x+1)^3|$$

$$\text{Fall 1: } (x+1)^3 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > -1:$$

$$\text{Dann ist } f(x) = (x+1)^3 \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 3(x+1)^2$$

$$\text{Fall 2: } (x+1)^3 < 0 \quad \Leftrightarrow \quad x < -1:$$

$$\text{Dann ist } f(x) = -(x+1)^3 \quad \Rightarrow \quad f'(x) = -3(x+1)^2$$

Zusatzfrage: Ist $f'(-1)$ definiert?



Übung: Berechnen Sie die Ableitung von $g(x) = \left| \frac{1}{x} \right|$. Ist $g'(0)$ definiert?

5.4. Mittelwertsatz und Satz von Taylor

- evtl. im Selbststudium bis vor Satz von Taylor, dafür Taylor in V ausführlich! -

Satz S 5-8 Mittelwertsatz der Differentialrechnung

Sei $f : [a,b] \rightarrow \mathbf{R}$ eine auf dem abgeschlossenen Intervall $[a,b]$ stetige und auf (a,b) differenzierbare Funktion. Dann existiert mindestens eine Stelle $u \in (a,b)$ mit

$$f'(u) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Anschaulich: Die Steigung der Sekante von a nach b (dies ist die *mittlere* Steigung von f im Intervall) wird an mindestens einer Stelle von der Ableitung angenommen.

Wir veranschaulichen uns die Aussage für den Spezialfall $f(a) = f(b) = 0$. Wenn eine auf einem Intervall differenzierbare Funktion zwei Nulldurchgänge hat, muß sie an einer Zwischenstelle die Steigung Null besitzen:

Ü Beispiel: $f(x) = -x(x-1)(x-2)$ hat die Nullstellen 0 und 1 . Damit muß die Funktion im Intervall $(0,1)$ eine Stelle u mit $f'(u) = 0$ besitzen. Prüfe als **Übung**, daß $f'(x) = -3x^2 + 6x - 2$ eine Nullstelle im Intervall $(0,1)$ besitzt.




Abbildung 5-2: Graph der Funktion $-x(x-1)(x-2)$ zur Erläuterung des Mittelwertsatzes

Eine Verallgemeinerung des Mittelwertsatzes ist der nachfolgende **Satz von Taylor**, der eine **enorme praktische Bedeutung** hat:

- damit rechnet der Taschenrechner komplizierte Funktionen wie $\sin(x)$, $\ln(x)$ aus,
- damit können wir uns von komplizierten Funktionen lokale Näherungen als einfaches Polynom machen
- und wir können abschätzen, welchen Fehler wir bei der Näherung maximal machen

Satz S 5-9 Satz von Taylor

Sei $f : [a,b] \rightarrow \mathbf{R}$ eine $n+1$ -mal differenzierbare Funktion. x_0 und x seien aus $[a,b]$. Dann ist

$$P_n(x - x_0) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$$

ein Polynom vom Grad n in der „Variablen $h = x - x_0$ “. Wir bezeichnen $P_n(h)$ als das **Taylor-Polynom** von f im Punkt x_0 .

Das Taylorpolynom hat in x_0 die gleichen Ableitungen 0. bis n . Ordnung wie f und ist in der Nähe von x_0 eine "gute" Näherung für f . Präziser: Der Fehler kann durch die Restglied-Formel (**Satz S 5-10**) abgeschätzt werden:

Satz S 5-10 Restglied-Formel

Sei $f : [a,b] \rightarrow \mathbf{R}$ eine $n+1$ -mal differenzierbare Funktion und sei $P_n(x - x_0)$ das Taylorpolynom von f in x_0 . x_0 und x seien aus $[a,b]$, mit $x_0 < x$. Dann gilt für den Fehler

$$|R_n(x)| = |f(x) - P_n(x - x_0)| \leq \frac{C}{(n+1)!} \cdot |x - x_0|^{n+1}$$

worin C eine obere Schranke von $|f^{(n+1)}(z)|$ im Intervall $[x_0, x]$ ist.

(Gilt dagegen $x < x_0$, so ist das Intervall $[x, x_0]$ zu nehmen.)

Bew.: [Stingl, 7. Aufl., S. 308]

BEACHTEN: $f(x_0)$, $f'(x_0)$, $f''(x_0)$, ..., $f^{(n)}(x_0)$ sind reine Zahlen, keine Funktionen!!

Beispiel: Wir möchten den natürlichen Logarithmus von $x=1.5$ mit einem Taylor-Polynom der Ordnung $n=3$ um $x_0=1$ abschätzen.

Wir verwenden den Satz von Taylor mit $f = \ln$, $x_0=1$, $h=x-x_0=0.5$, $n=3$ und stellen die folgende Tabelle auf

n	$f^{(n)}(x)$	$f^{(n)}(1)$
0	$\ln(x)$	0
1	x^{-1}	1
2	$-x^{-2}$	-1
3	$+2x^{-3}$	+2
4	$-6x^{-4}$	

$$P_3(x-1) = \ln(1) + f'(1) \cdot (x-1) + \frac{f''(1)}{2!} \cdot (x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!} \cdot (x-1)^3$$

$$= 0 + (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + 2 \cdot \frac{1}{6}(x-1)^3 \Rightarrow$$

$$\ln(1.5) \approx P(1.5-1) = \binom{1}{2} - \frac{1}{2} \binom{1}{2}^2 + \frac{1}{3} \binom{1}{2}^3 = \frac{10}{24} = 0.41\bar{6}$$

Welcher Fehler steckt maximal in dieser Abschätzung?

Weil $|f^{(4)}(x)|$ im Intervall $[1, 1.5]$ monoton fallend ist, ist der linke Rand eine obere Schranke $C = |f^{(4)}(1)| = 6$. Daher lautet die Restgliedabschätzung

$$|R_3(1.5)| = |f(1.5) - P_n(1.5-1)| \leq \frac{6}{(3+1)!} \cdot |1.5-1|^{3+1} = \frac{6}{24 \cdot 16} = 0.0156,$$

der relative Fehler $0.0156/0.4166$ ist also kleiner als 4%.

Mit dem Taschenrechner überprüft man leicht, dass

$$\left| \ln(1.5) - \frac{10}{24} \right| = 0.01120$$

diese Restgliedabschätzung auch erfüllt.

Die Abschätzung kann (für viele Funktionen) mit höherem n beliebig verbessert werden!



Übung: Bestimmen Sie das Taylorpolynom zu $f(x) = \sin x$ an der Stelle $x_0 = 0$ zum Grade 5. Wie genau ist die Abschätzung für $x = 0.3$?

n	$f^{(n)}(x)$	$f^{(n)}(0)$
0	$\sin(x)$	0
1	$\cos(x)$	1
2	$-\sin(x)$	0
3	$-\cos(x)$	-1
4	$\sin(x)$	0
5	$\cos(x)$	1



Wie Abbildung 5-3 zeigt, wird die Sinus-Funktion durch ein Taylorpolynom vom Grade 7 bereits gut auf dem Intervall $(-\pi, +\pi)$ dargestellt.




Abbildung 5-3: Approximation der Sinus-Funktion durch seine Taylorpolynome im Punkt $x=0$.

Anwendungsfall FPGA: Das mit dem Restglied kommt vielen Studierenden meist erstmal „spanisch“ vor. Zum besseren Verständnis betrachten wir folgendes Beispiel: Sie wollen auf einem Embedded System (FPGA, Handy o.ä.) eine bestimmte Applikation programmieren, die es erfordert, dass die Funktion $f(x) = \cos(x) + \sin^2(2x)$ gerechnet wird. Nun kann Ihr FPGA keine trigonometrischen Berechnungen, die Grundrechenarten kann er aber wohl.

Sie können nun $f(x)$ durch sein Taylorpolynom approximieren. Dem Anwender soll auch bei jeder Eingabe x von der Applikation gesagt werden, wie groß der Fehler ist. Natürlich haben Sie auch keine trigonometrischen Funktionen für die Fehlerbestimmung zur Verfügung, Sie können also nicht $|f(x) - P_n(x)|$ auf dem FPGA rechnen. Hier kommt nun die Rettung in Form des Restgliedes: Mit der Formel

$$|R_n(x)| \leq \frac{C}{(n+1)!} \cdot |x - x_0|^{n+1}$$

können Sie den Fehler für jedes x abschätzen, ohne eine trigonometrische Berechnung zu brauchen. Dazu müssen Sie nur zum Zeitpunkt der Programmierung, wenn Sie alle trigonometrischen Funktionen zur Hand haben, die Konstante C abschätzen und in Ihre Applikation einbauen.

Übung: Gegeben sei die Funktion $f(x) = \cos(x) + \sin^2(x/2)$

und der Entwicklungspunkt $x_0=0$.

- Bestimmen Sie das Taylorpolynom $P_2(x)$.



2. Wie lautet nach **Satz S 5-10** die Restgliedformel für $|R_2(x)|$, die Sie für jedes x auf Ihrem FPGA rechnen können?
3. Was gibt die die Restgliedformel für $x=0.5$ und $x=-2$ für einen Wert an?
4. Wieviel Multiplikationen brauchen Sie auf dem FPGA je x -Wert?

Hinweis 1: Mit der Formel $2\sin(a)\cos(a) = \sin(2a)$ (an richtiger Stelle eingesetzt!) können Sie sich das Ableiten deutlich vereinfachen.

Hinweis 2: Schätzen Sie im Restglied einfach Sinus und Cosinus durch 1 ab (!)

Lösung in Vorlesung.

Fazit: Man braucht nur 2 Multiplikationen für $P_2(x-x_0)$ und 3 Multiplikationen für $R_2(x)$!! Das ist eine ganz erhebliche Vereinfachung und macht Ihre Applikation auf dem FPGA erst lauffähig.



Übung: Näherungsformel für "Blutroter Sonnenuntergang am Äquator":

Wir hatten in Übungsblatt 3 (Trigonometrische Funktionen) die Formel

$$h = R \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right) \quad \text{mit} \quad \alpha = \omega T$$

($\omega=2\pi/1440$ über Dreisatz und $T = \text{Zeit in Minuten}$) für die Höhe des Berges hergeleitet. Typischerweise sind die Winkel α sehr klein. Wie kann man daraus eine einfache Formel für den Zusammenhang Höhe vs. Verlöschzeit herleiten? Leiten Sie die Faustformel her: "Höhe Berg = 57 m mal Verlöschzeit[min] **zum Quadrat.**"

5.5. Regeln von de l'Hospital

- ausführlicher in Übung -

Für die Analyse von Kurven haben die Regeln von de l'Hospital eine besondere Bedeutung. Sie stellen ein Hilfsmittel für die Bestimmung von Grenzwerten von Funktionen in „Ausnahmefällen“ dar.

Satz S 5-11 Regeln von de l'Hospital

Seien f und $g: U(x_0) \rightarrow \mathbf{R}$ auf einer Umgebung von x_0 differenzierbare Funktionen, und es sei $g'(x_0) \neq 0$.

Unter der Voraussetzung $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ ("0/0-Situation", **Regel 1**) oder unter

der Voraussetzung $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ (" ∞/∞ -Situation", **Regel 2**) gilt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

falls der letztgenannte Grenzwert existiert.

Beispiel: Man berechne den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ mit Hilfe der Regeln von de l'Hospital!

Mit $f(x) = \sin x$ und $g(x) = x$ sind die Voraussetzungen der 1. Regel von de l'Hospital erfüllt:

- Differenzierbarkeit von f und g in einer Umgebung von $x=0$,
- $g'(0) = 1 \neq 0$,
- $f(0) = g(0) = 0$.

Wir betrachten deshalb $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(x))'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1$. Aus der Existenz dieses

Grenzwertes folgt nunmehr also $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

Bemerkungen: a) Bleibt der Ausdruck $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ unbestimmt, so können die Regeln von de l'Hospital iterativ angewendet werden.

Beispiel: Man berechne den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$!



b) Existieren der Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ nur links- oder rechtsseitig, so gelten die Regeln von de l'Hospital ebenfalls links- bzw. rechtsseitig.

Betrachte als Beispiel: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x!$

Wähle $f(x) = \ln x$ und $g(x) = x^{-1}$. Zeige, daß mit $f'(x) = x^{-1}$ und $g'(x) = -x^{-2}$ der

Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 0$ existiert. Das bedeutet $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

c) Die Regeln von de l'Hospital gelten auch für $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ ♦

d) Existiert aber der letztgenannte Grenzwert in Satz 5-11 nicht, ist also z.B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$, dann darf mit dem Ergebnis nicht weitergerechnet werden. Beispiel hierzu in den Übungen!

5.6. Eigenschaften differenzierbarer Funktionen

Der große Nutzen der Differentialrechnung liegt darin, dass man den Verlauf von Kurven quantitativ "in den Griff bekommt". Über Ableitungen können wir die Minima und Maxima differenzierbarer Funktionen direkt ausrechnen.

Dies hat vielfältige Anwendungen. Hier eine Extremwertaufgabe als einführendes **Beispiel**:

Eine Produktionsmaschine kostet $K=90.000\text{€}$ in der Anschaffung und verursacht im Jahre t Reparaturkosten $R(t) = 100+3t^3 \text{ €}$. Wie lange soll man die Maschine halten, um die durchschnittlichen jährlichen Kosten zu minimieren?

Lösung am Ende des Kapitels.

Folgende Eigenschaften von Funktionen können über Ableitungen errechnet werden

- Monotonie u. Krümmungsverhalten
- Extremwerte
- Wendepunkte und Wendetangente
- Asymptoten [s. Stingl04]

5.6.1. Monotonie und Krümmungsverhalten

Satz S 5-12 Monotonie

Sei $I = [a,b] \subseteq D_f$ ein Intervall und $f: D_f \rightarrow W_f$ eine differenzierbare Funktion. Es gilt:

$f'(x) \geq 0$ (bzw. ≤ 0) für alle $x \in I \Leftrightarrow f$ ist monoton wachsend (bzw. fallend) in I .

$f'(x) > 0$ (bzw. < 0) für alle $x \in I \Rightarrow f$ ist streng monoton wachsend (bzw. fallend) in I .

Beachte: Bei "streng monoton" gilt nur das " \Rightarrow "-Zeichen. Die strenge Monotonie gilt auch, wenn " $f'(x) > 0$ in I bis auf endlich viele $x \in I$ " (denn z.B. $f(x)=x^3$ ist streng monoton wachsend, obwohl $f'(0)=0$, aber eben nur an dieser einen Stelle)

Satz S 5-13 Krümmungsverhalten (konvex/konkav)

Sei $I = [a,b] \subseteq D_f$ ein Intervall und $f: D_f \rightarrow W_f$ eine differenzierbare Funktion. Sei $S(x_1, x_2)$ die Sekante, die x_1, x_2 verbindet. Es gilt:

f ist **konkav** auf $I \Leftrightarrow$ für alle $x_1, x_2 \in I$ verläuft $S(x_1, x_2)$ unterhalb des Funktionsgraph

f ist **konvex** auf $I \Leftrightarrow$ für alle $x_1, x_2 \in I$ verläuft $S(x_1, x_2)$ oberhalb des Funktionsgraph

Das Krümmungsverhalten ergibt sich aus der 2. Ableitung:

f ist **konkav** auf $I \Leftrightarrow f''(x) \leq 0$ für alle $x \in I$

f ist **konvex** auf $I \Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ für alle $x \in I$

5.6.2. Extremwerte

Def D 5-3 Extremwerte von Funktionen

f besitzt an der Stelle x_0 ein relatives Maximum, falls in einer Umgebung $U(x_0)$ von x_0 gilt
 $f(x_0) > f(x)$ für alle $x \in U(x_0)$

f besitzt an der Stelle x_0 ein relatives Minimum, falls in einer Umgebung $U(x_0)$ von x_0 gilt
 $f(x_0) < f(x)$ für alle $x \in U(x_0)$

Satz S 5-14 Notwendige Bedingung für Extremwerte differenzierbarer Funktionen

Sei f differenzierbar und f besitze in x_0 einen relativen Extremwert (Minimum oder Maximum), dann folgt $f'(x_0) = 0$.

Satz S 5-15 Hinreichende Bedingung für Extremwerte differenzierbarer Funktionen

Eine Funktion f sei 2-mal differenzierbar und es gelte $f'(x_0) = 0$.

Dann folgt aus $f''(x_0) < 0$: f hat in x_0 ein Maximum,

aus $f''(x_0) > 0$: f hat in x_0 ein Minimum.

Beispiel: $f(x) = x^3 - 3x^2$.




Abbildung 5-4: $f(x) = x^3 - 3x^2$ mit 1. und 2. Ableitung

$f(x) = x^3 - 3x^2$ ist eine zumindest 2-mal stetig differenzierbare Funktion:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$f''(x) = 6x - 6.$$

Wir prüfen zunächst die notwendige Bedingung für Extrema: $f'(x_0) = 0$. Hier also

$$3x_0^2 - 6x_0 = 0$$

Die Nullstellen von f' lauten: $x_{0,1} = 0$ bzw. $x_{0,2} = 2$. Für diese beiden Nullstellen von f' prüfen wir jetzt das hinreichende Kriterium $f''(x_0) < 0$ bzw. $f''(x_0) > 0$. Es gilt

$$f''(x_{0,1}) = 6x_{0,1} - 6 = -6 < 0$$

$$f''(x_{0,2}) = 6x_{0,2} - 6 = +6 > 0$$

Aus **Satz S 5-15** folgt $x_{0,1}$ ist ein Maximum und $x_{0,2}$ ist ein Minimum von f (siehe auch Abbildung). ♦

Bemerkung: In 95% aller Fälle reichen **Satz S 5-14** und **Satz S 5-15**. ABER: Es gibt Fälle, in denen die beiden Kriterien zu keiner Entscheidung über Minimum bzw Maximum führen,

-- wenn Zeit knapp, dann diesen Teil im Selbststudium --

Beispiel 1: $f(x) = x^3$. Hier ist das notwendige Kriterium bei $x_0 = 0$ erfüllt, das hinreichende nicht. $x_0 = 0$ ist auch kein Extremwert, sondern eine sogenannte Wendestelle.

Beispiel 2: $f(x) = x^4$. Hier ist das notwendige Kriterium bei $x_0 = 0$ erfüllt, das hinreichende nicht. Trotzdem ist $x_0 = 0$ ein Extremwert, und zwar ein Minimum (s. Abb. 5.4)




Abbildung 5-5: Veranschaulichung von x^3 mit Sattelpunkt bei $x = 0$ und x^4 mit Minimum bei $x = 0$

Wir führen deshalb ein allgemeineres hinreichendes Kriterium ein:

Satz S 5-16 Notwendige und hinreichende Bedingung für Extremwerte, bzw. Sattelpunkte differenzierbarer Funktionen

Sei f n -mal differenzierbar mit $n \geq 2$, und es gelte $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ und $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Dann gilt:

a) Ist n gerade, so hat f in x_0 ein Extremum, und zwar falls

$$f^{(n)}(x_0) < 0 : f \text{ hat in } x_0 \text{ ein Maximum,}$$

$$f^{(n)}(x_0) > 0 : f \text{ hat in } x_0 \text{ ein Minimum.}$$

b) Ist n ungerade, so hat f in x_0 kein Extremum, sondern einen sogenannten **Sattelpunkt**.

5.6.3. Wendepunkte

Def D 5-4 Wendepunkt

Sei f n -mal differenzierbar mit $n \geq 2$, und es gelte $f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ und $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, und n sei eine ungerade Zahl, so hat f in x_0 einen sogenannten Wendepunkt.

Häufigster Fall $n=3$: $f''(x_0) = 0$ und $f^{(3)}(x_0) \neq 0$

Ein **Sattelpunkt** ist ein Spezialfall eines Wendepunktes mit horizontaler Steigung, das heißt mit $f'(x_0) = 0$.




Abbildung 5-6: Wendepunkt $x = 2$ und Wendetangente an die Funktion $x(x-3)^2$

Die **Wendetangente** im Wendepunkt x_0 ergibt sich aus der Steigung und Funktionswert im Wendepunkt

$$w(x) = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$$



Übung: Bestimmen Sie rechnerisch Nullstellen, Wendepunkte und Wendetangente(n) für $f(x) = x(x-3)^2$.



Übung: Lösen Sie die Eingangsaufgabe zu Kap. 5.6 (Betriebsdauer Produktionsmaschine)

Weitere Extremwertaufgaben in Übungen!

5.7. Fazit

5.7.1. Kurvendiskussion

Wir stellen nun die Kriterien zusammen, nach denen eine umfassende Kurvendiskussion durchgeführt werden kann:

Def D 5-5 Kurvendiskussion

In einer Kurvendiskussion sind folgende Merkmale einer (differenzierbaren) Funktion zu untersuchen:

1. Definitionsbereich bzw. Definitionslücken
2. Wertebereich
3. Symmetrie
4. Periodizität
5. Nullstellen und Pole
6. Grenzwerte bei Annäherung an Definitionslücken
7. Verhalten der Funktion für $x \rightarrow \pm\infty$ (Grenzwerte, Asymptoten)
8. Extremstellen (Hoch- und Tiefpunkte)
9. Wendepunkte (mit Wendetangente, Spezialfall: Sattelpunkt)
10. Graph der Funktion **zeichnen**
11. Monotoniebereiche

Zweckmäßigerweise geht man in der gezeigten Reihenfolge vor, mit einer Ausnahme:

- bei komplizierten Funktionen lässt sich der Wertebereich u.U. erst ganz am Schluss angeben, wenn man alle Extremstellen und Monotoniebereiche überblickt und den Graphen gezeichnet hat;

In einer **verkürzten Kurvendiskussion** können die Punkte Wertebereich, Symmetrie, Periodizität, Grenzwerte an den Def.lücken, Asymptoten, Wendetangente, Sattelpunkt und Monotoniebereiche entfallen. Es verbleiben also:

Def D 5-6 verkürzte Kurvendiskussion

1. Definitionsbereich bzw. Definitionslücken
2. Nullstellen und Pole
3. Grenzwerte der Funktion für $x \rightarrow \pm\infty$
4. Extremstellen (Hoch- und Tiefpunkte)
5. Wendepunkte
6. Graph der Funktion **zeichnen**

5.7.2. Wichtige Ergebnisse dieses Kapitels

- **Ableitung** = Steigung einer Funktion

- Lösung von **Extremwertaufgaben**: notwendige Bedingung für Minimum: $f'(x)=0$, hinreichende Bedingung: erste nichtverschwindende Ableitung $f^{(n)}(x) > 0$ **UND n gerade**.
- Satz von **Taylor**: approximiert komplizierte Funktion (z.B. $e^{x \cos x} \sin x$) durch einfaches Polynom $\sum_i a_i (x - x_0)^i$. Nutzen: (a) numerische Approximation; (b) einfachere Formeln für symbolisches Rechnen; (c) Integration von analytisch nicht-integrierbaren Funktionen (s. nächstes Kapitel).